

火気厳禁

ソフラテトラメンALC



指定医薬部外品（分包タイプ）

アルコール含浸カット綿



便利な個包装タイプ！

個包装
(2包つづり)

●商品名：
ソフラテトラメンALC

| | | | |
|---------------|--|------|------------------|
| 販売名 | サニコットEQ | | |
| 製造販売元 | 丸三産業株式会社 | 区分 | 指定医薬部外品（外皮消毒剤） |
| 承認年月 | 平成23年9月30日 | 承認番号 | 22300DZX01210000 |
| 成分 | エタノール：76.9～81.4vol% 日局 エタノール、日局 精製水 | | |
| 使用上の注意 | <p>〈次の人には使用しないこと。〉 患部が広範囲な人、深い傷やひどいやけどの人。</p> <p>〈次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。〉 ○医師の治療を受けている人。 ○本人又は家族がアレルギー体質の人。 ○薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>〈使用中または使用後は、次のことに注意すること。〉 ○使用後に皮膚の、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。 ○5～6日間使用しても症状の改善が見られない場合には、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。</p> | | |
| 効能・効果 | 手指・皮膚の洗浄・消毒 | | |
| 用法・用量 | 使用時本品を開けて脱脂綿をとり、そのまま手指に塗布又は塗擦する。 | | |
| 用法及び用量に関連する注意 | ○小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。○目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。 ○外用にのみに使用すること。○粘膜へは使用しないこと。 | | |
| 保管及び取扱い上の注意 | ○直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。○小児の手の届かない所に保管すること。○他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）○火気に近づけないこと。 | | |

| 商品番号 | 規格 | 販売単位 | 定価 | JAN CODE | ケース単位 |
|--------|------------------------------|------|-----------------------|---------------|-------|
| 003751 | エタノール 脱脂綿 4cm×4cm 2枚重ね 200包入 | 1箱 | 2,200円(税込) 2,000円(税別) | 4958995037517 | 24箱 |
| 003752 | エタノール 脱脂綿 4cm×4cm 2枚重ね 60包入 | 1箱 | 880円(税込) 800円(税別) | 4958995037524 | 10箱 |

発売元



URL <http://taketora-web.com/> E-mail info@taketora-web.com

【メディカル事業部】

東日本営業部 〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町 2-6-8 横浜関内ビル
TEL.045(680)0308(代) FAX.045(680)0312

西日本営業部 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江坂南口第二ビル
TEL.06(6386)7217(代) FAX.06(7175)7101

取扱店